

Pautas objetivas para la evaluación de incapacidades psicofísicas

Dirección de Reconocimientos Médicos de la Pcia. de Buenos Aires

10	Psiquiatría	
10.1	Psicosis	
10.1.1.	Psicosis confusionales leves	30 a 50%
10.1.2.	Psicosis confusionales moderadas	60 a 80%
10.1.3.	Psicosis confusionales graves	80 a 100%
10.1.4	Psicosis delirantes agudas leves	30 a 50%
10.1.5	Psicosis delirantes agudas moderadas	60 a 80%
10.1.6	Psicosis delirantes agudas graves	80 a 100%
10.1.7	Melancolía moderada	50 a 70%
10.1.8	Melancolía grave	80 a 100%
10.1.9	Psicosis maniaco-depresiva	80 a 100%
10.1.10.	Demencias	80 a 100%
10.1.11.	Psicosis esquizofrénicas con relativa adaptación	50 a 100%
10.1.12.	Psicosis esquizofrénicas con inadaptación	80 a 100%
10.1.13.	Delirios crónicos adaptados al medio	50 a 70%
10.1.14.	Delirios crónicos inadaptados al medio	80 a 100%
10.1.15.	Oligofrenia: Debilidad mental	30 a 50%
10.1.16.	Oligofrenia: Imbecilidad	60 a 80%
10.1.17.	Oligofrenia: Idiocia	80 a 100%
10.1.18.	Deterioro presenil leve	50 a 70%
10.1.19.	Deterioro presenil grave	80 a 100%
10.1.20.	Deterioro senil leve	50 a 70%

10.1.21.	Deterioro senil grave	80 a 100%
10.1.22.	Evolución psicótica de cualquier disturbo mental leve	50 a 70%
10.1.23.	Evolución psicótica de cualquier disturbo mental grave	80 a 100
11.	Neurosis y psicopatías	
11.1.1.	Neurosis de angustia leve	10 a 30%
11.1.2.	Neurosis de angustia moderada	40 a 60%
11.1.3.	Neurosis de angustia grave	70 a 80%
11.1.4.	Neurosis fóbica leve	10 a 30%
11.1.5.	Neurosis fóbica moderada	40 a 60%
11.1.6.	Neurosis fóbica grave	70 a 80%
11.1.7.	Histeria leve	10 a 30%
11.1.8.	Histeria moderada	40 a 60%
11.1.9.	Histeria grave	70 a 80%
11.1.10	Neurosis obsesiva compulsiva	50 a 70%
11.1.11.	Psicastenia	50 a 70%
11.1.12.	Personalidad psicopática con adaptación al medio	40 a 60%
11.1.13.	Personalidad psicopática con inadaptación al medio	70 a 90%
11.1.14.	Tóxico adicción leve	20 a 30%
11.1.15.	Tóxico adicción moderada	40 a 60%
11.1.16.	Tóxico adicción grave	70 a 100%
11.1.17.	Síndrome depresivo reactivo en período de estado leve	10 a 20%
11.1.18.	Síndrome depresivo reactivo en período de estado moderado	30 a 50%
11.1.19.	Síndrome depresivo reactivo en período de estado grave	60 a 100%
11.1.20.	Neurosis depresiva leve	10 a 30%
11.1.21.	Neurosis depresiva moderada	40 a 60%

11.1.22.	Neurosis depresiva grave	70 a 80%
11.1.23.	Síndrome depresivo involutivo leve	40 a 60%
11.1.24.	Síndrome depresivo involutivo grave	70 a 100%
11.1.25.	Síndrome de fatiga psicofísica leve	20 a 30%
11.1.26.	Síndrome de fatiga psicofísica en período de estado	40 a 70%
11.1.27.	Neurosis mixta sin deterioro	50 a 50%
11.1.28.	Neurosis mixta con deterioro	60 a 70%